

ZMK

ZAHNHEILKUNDE | MANAGEMENT | KULTUR

10

Oktober 2025

41. Jahrgang

ISSN 1862-0914

E12169

8,- Euro



ZAHNMEDIZIN

Frontzahnästhetik: Veneers
und Kompositrestaurationen

FINANZEN

So geht Geldanlage – Tipps
für die Zahnmediziner/innen

ZAHNMEDIZIN

Die „neue Patientengenera-
tion“ der Hundertjährigen



Formveränderung mit direkten Kompositrestaurationen im Frontzahnbereich – konservierender „Lückenschluss“ bei Diastema laterale

In vorliegender Fallbeschreibung einer Patientin (26 Jahre) mit guter allgemeiner Gesundheit zeigt die Ausgangssituation eine durch Platzüberangebot (Diskrepanz Kiefer- zu Zahngröße) lückig stehende seitliche Unterkiefer-Frontbeziehung. Aufgrund ihrer hohen Lachlinie wünscht sich die Patientin eine Verbesserung der ästhetischen Situation mit möglichst „einfachen Mitteln“.

A Mit der Einführung von Mikrohybridkompositen und der Anwendung von Schmelz- und Dentinkompositen im Schichttechnikverfahren [1a] Ende der 1990er Jahre wurden Modifikationen der Zahnform wie beispielsweise das Schließen von Diastema oder die Korrektur eines unregelmäßigen Inzisalkantenverlaufs praktisch und minimalinvasiv durchführbar. Die Silikonschlüsseltechnik wurde ursprünglich für direkte Klasse-IV- und -V-Restaurationen entwickelt, eignet sich jedoch auch für kleinere Formkorrekturen beispielsweise bei unregelmäßigem Inzisalkantenverlauf. Heute umfasst das übliche Verfahren für Frontzahnrestaurationen eine Komposit-schichttechnik, unterstützt durch einen Silikonschlüssel, der auf einem Wax-up beruht [1b].

Patientenfall

Allgemein- und zahnmedizinische Anamnese

Erstbesuch und Erhebung der allgemeinmedizinischen Anamnese erfolgten am 24.10.2024. Es lagen weder Erkrankungen noch regelmäßige Medikamenteneinnahme vor. Die Patientin ließ sich aus ästhetischen Gründen 2018 alio loco die gesamte Oberkieferfront mit verblockten Zirkonkronen versorgen (**Abb. 1**) und kam nun für eine Zweitmeinung bezüglich ihrer unbefriedigenden Unterkiefer-Frontsituation. Ihr Wunsch bestand darin, die Lücke 31/32 mit möglichst einfachen Mitteln wieder ästhetischer

zu gestalten (**Abb. 2**). Eine kieferorthopädische und/oder prothetische Variante kam aus finanziellen Überlegungen nicht in Betracht. Nach Aufklärung und eingehender Beratung war die Patientin mit der vorgeschlagenen Behandlung einverstanden.



Abb. 1: Front in Okklusion.



Abb. 2: UK-Front 33 bis 43 (bereits eingelegte Retraktionsfäden).

Klinische Befunde

Rote Ästhetik

Im Ober- und Unterkiefer zeigt sich nur ein schmales Band an keratinisierter Schleimhaut. Die Gewebestärke entspricht einem dünnen Biotyp (**Abb. 2**). Die Patientin verfügt über eine mittlere bis stark geformte Ober- und Unterlippe. Die Lachlinie verläuft mittelhoch.

Weißer Ästhetik

Zahnlänge der OK-Front empfindet die Patientin als ausreichend lang. Das entspannte Lächeln zeigt ca. zwei Drittel der Frontzahnlänge. Im Unterkiefer zeigen sich ovale/dreieckige Zahnformen. Die ursprüngliche anatomische Kauflächenstruktur in den Seitenzahnbereichen ist vorhanden. Die Zahnfarbe entspricht dem Alter der Patientin.

Röntgenologischer Befund

Das OPT (**Abb. 1a**) gibt keinen Anhalt auf nicht zahnverursachte Prozesse, alle vier Weisheitszähne sind vorhanden und retiniert. Die Bissflügel aufnahmen (**Abb. 1b und c**) zeigen insuffiziente konservierende Versorgungen an den Zähnen 26, 36, 37 und 46 sowie okklusale Karies an Zahn 16.



Abb. 1a: OPT Ausgangssituation.



Abb. 1b: Bissflügel aufnahmen.




Abb. 1c: Bissflügel aufnahmen.

Diagnosen

Aus der klinischen und röntgenologischen Befundung leiteten sich die Diagnosen konservierend insuffizient versorgtes Erwachsenen Gebiss und Diastema laterale Unterkiefer links (Platzüberangebot UK FZB) ab.

Behandlungsverlauf

Nach Befundaufnahme und professioneller Zahnreinigung wurde ein CMD-Kurzscreening durchgeführt und ein Fotostatus erstellt. Ein intraorales Mock-up [2] wurde auf Wunsch der Patientin und aus Kostengründen nicht angefertigt. Definitive Versorgung Adhäsivrestaurationen mit Komposit an 31/32 zum Schluss des Diastema laterale (**Abb. 3 bis 9**).



Abb. 3: Absolute Trockenlegung mit Kofferdam und Ligaturen.



Abb. 4: Abstrahlen der Schmelzoberfläche (minimal-invasiv, Non-Prep) mit Aluminiumoxidpulver der Korngröße 27 µm, Anlegen einer gewölbten Matrize und Fixierung mit Flowable Komposit (Tetric Flow, Ivoclar), Schmelzätzung mit 37%iger Phosphorsäure (Ultradent).



Abb. 5: Schichtung mit Komposit (Empress Direct Enamel A1, Ivoclar).



Abb. 6: Fertig geschichtete Restauration an 31, Ausarbeitung, Politur.



Abb. 7: Schichtung mit Komposit an 32 (Empress Direct Enamel A1, Ivoclar).



Abb. 8: Ausarbeitung, Politur.



Abb. 9: Fertiggestellte Kompositrestaurationen 31 und 32.

Diskussion/Epikrise

Grundsätzlich stand die Diskussion einer Gesamtsanierung (Austausch der insuffizienten Zirkonkronen aufgrund von Randspalten/Sekundärkaries, Entfernung retinierte 8er) im Raum. Die Patientin wünschte sich jedoch lediglich den Diastemaschluss im seitlichen UK-Frontzahnbereich und entschied sich nach Abwägung sowohl ethischer als auch finanzieller Aspekte vorerst nur für die Korrektur/Verbesserung der Zahnstellung im Unterkiefer mit direkten freihändig geschichteten Kompositaufbauten an 31 und 32. Konservierende (Füllungstherapie, In-Office-Bleaching), kieferorthopädische (Alignertherapie) und prothetische (Austausch der Zirkonkronen 13 bis 23) Maßnahmen hat sie aus finanziellen Überlegungen vorerst zurückgestellt [3,4].

Die Zahnproportionen 31/32 erscheinen nach Aufbau mit Komposit insbesondere im mesiodistalen Bereich etwas „ausgeprägter“ im Vergleich zur kontralateralen Seite und sollten daher als Kompromiss betrachtet werden. Die leicht eingekerbten/geackten Inzisalkanten wünschte sich die Patientin etwas geradliniger. Dies hätte durch eine Formanpassung in Komposit bei 41 und 42 mit einem zusätzlichen Aufwand korrigiert werden können, wurde jedoch von der Patientin abgelehnt [5]. Für sie ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend. Für den Behandler stellt sich die Behandlung – als Kompromiss – ebenso als Erfolg dar.

Rote Ästhetik

Es zeigen sich postoperativ leichte Irritationen der Gingiva, die durch das Legen der Retraktionsfäden/Ligaturen entstanden sind und sich nach Abheilung und Reifung im Interdentalbereich noch adäquat ausformen werden, um somit einem ansprechenden dentogingivalen Erscheinungsbild zu entsprechen.

Weisse Ästhetik

Die Zahnform der beiden unteren Schneidezähne 31 und 32 entspricht nach Diastemaschluss nun den Wünschen der Patientin (**Abb. 10**). ■



Abb. 10: UK-Front 33 bis 43 (Schlussbild).

Bilder: © Egger

Literatur:

- [1a] Dietschi D, Fahl N. Shading concepts and layering techniques to master direct anterior composite restorations: an update. Br Dent J. 2016; 221: 765-771.
- [1b] Manauta J, Salat A, Monterubbiani R, Tosco V, Devoto W, Orsini G, Putignano A. Fortschritte bei Diastemaschluss und Formveränderung mit direkten Kompositrestauratione: Die Front-Wing-Technik. Eur J Esthet Dent. 2022; 4: 404-419.
- [2] Rufenacht CR. Fundamentals of Esthetics. Chicago: Quintessenz, 1990: Kapitel 4; 67-134.
- [3] Egger S. Formveränderung mit direkten Kompositrestaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Zahnärzteblatt SACHSEN 2024; 32 (4): 22-25.
- [4] Egger S, Greven M. Editorial Digitale (Ästhetische-) Zahnmedizin versus Funktion ZWL 2020; 23 (6): 3.
- [5] D'Amico A. The canine teeth-normal functional relation of the natural teeth of man. J South Calif Dent Assoc. 1958; 26: 6-23, 49-60, 127-142, 175-182, 194-208, 239-241.

Dr. Sven Egger, MSc

1993–1998 Studium der Zahnmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
 1999–2002 Assistenz Zahnarzt an der Volkszahnklinik Basel (CH)
 2002–2003 Angestellter Zahnarzt in der Rheinklinik Rheinfelden-Baden
 2003–2004 Selbstständiger Zahnarzt in Privatklinik, Basel (CH)
 2004 Niederlassung in eigener Praxis in Basel (CH)
 2002–2009 Master of Science (MSc) Implantologie und ästhetisch rekonstruktive Zahnheilkunde an der Donau-Universität Krems (A)
 Mai 2019 Ernennung zum Spezialisten für Ästhetik und Funktion in der Zahnmedizin (DGÄZ)
 Februar 2020 Ernennung zum Spezialisten für rekonstruktive Zahnmedizin, Ästhetik und Funktion (European Dental Association)
 Mitglied der DGÄZ, DGZMK, DGI und SAQ



Dr. Sven Egger

MSc Spezialist für Ästhetik und Funktion in der Zahnmedizin (DGÄZ, EDA)
 Grünpfahlgasse 8
 CH-4001 Basel
 Tel.: 0041 61 2618333
 Fax: 0041 61 2618351
 DrSven-Egger@aesthetikart.ch
 www.aesthetikart.ch